

MacroLedin

12 g pulver till oral lösning
Makrogol 4000

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Denna produkt är receptfri vid behandling av lindriga besvär utan hjälp av läkare. MacroLedin måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till hälso- och sjukvårdsutbildad personal om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om några biverkningar (se avsnitt 4) blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller hälso- och sjukvårdsutbildad personal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad MacroLedin är och vad det används för
2. Innan du använder MacroLedin
3. Hur du använder MacroLedin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur MacroLedin ska förvaras och kastas
6. Övriga upplysningar

1. VAD MACROLEDIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

MacroLedin innehåller makrogol 4000 i pulverform, och det används vid behandling av förstoppning. Makrogol binder vatten och därigenom ökar tarmens vatteninnehåll. Detta gör att den hårda avföringsmassan blir mjukare som leder till normaliserade tarmrörelser och att man får en laxerande effekt. Makrogol binder inte vätska från kroppen. Makrogol går ut från kroppen med avföringen.

2. INNAN DU ANVÄNDER MACROLEDIN

Använd inte MacroLedin

- om du är allergisk (överkänslig) mot makrogol.
- om du har förträngningar i tarmen.
- om du löper av risk för sår i tarmväggen.
- om du har svår inflammatorisk tarmsjukdom (t.ex. Crohns sjukdom, sårig tjocktarmsinflammation (ulcerös kolit), toxisk megacolon).

Var särskilt försiktig med MacroLedin

- om förstoppningen har utvecklats eller försämrats snabbt. Det kan vara tecken på förträngningar i tarmen. I sådana situationer vänd dig alltid till läkare.

Samtidigt användning av läkemedel

Inga kända interaktioner.

Tala med din läkare vid användning av samtidig medicinering.

Graviditet och amning

Det finns inte erfarenhet av användning av MacroLedin under graviditet eller amning. MacroLedin bör därför användas under graviditet och amning endast efter läkares övervägande.

3. HUR DU ANVÄNDER MACROLEDIN

Om läkaren inte ordinerat annat, följ följande bruks- och doseringsanvisningar.

Dosen kan tas när som helst på dygnet.

Ej för barn under 2 år.

Vanlig behandlingstid är högst 14 dygn. Behandlingen kan upprepas om det är nödvändigt. Läkare kan även rekommendera längre behandlingstid.

Bruksanvisning:

Dospåsar:

Öppna en dospåse och häll innehållet i ca 2 dl (ett glas) vätska: vatten eller saft. Rör om lösningen tills pulvret har löst upp sig helt i vätskan och drick lösningen.

Dosering:

Vuxna och barn över 8 år:

Vanlig dosering är en dospåse (12 g) blandat i vätska 1-2 gånger per dygn.

Om du har tagit för stor mängd av MacroLedin

Stora doser kan ge biverkningar. Vid överdosering bör användningen av produkten avbrytas.

Om du har glömt att ta MacroLedin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt användningen av MacroLedin enligt dosanvisningar.

Om du har ytterligare frågor om användning av denna produkt, kontakta läkare eller hälso- och sjukvårdsutbildad personal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Vid vanlig dosering uppkommer oftast inga biverkningar. Vid höga doser kan det uppkomma symtom i mag-tarmkanalen såsom magknip, svullnad i buken, gaser, diarré eller illamående.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller hälso- och sjukvårdsutbildad personal.

5. HUR MACROLEDIN SKA FÖRVARAS OCH KASTAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte produkten om den är skadad.

Använd inte efter utgångsdatumet. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Dospåsar skall förvaras torrt, vid rumstemperatur.

Färdigblandad oral lösning i vatten håller 24 timmar i kylskåp (2–8 °C).

Produkten ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man kastar produkt som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är makrogol 4000. Produkten innehåller inga andra ämnen.

Laktosfri ock sockerfri.

Produktens utseende och förpackningsstorlekar

Vitt eller nästan vitt pulver.

Förpackningar:

- 20 x 12 g dospåsar i kartong.



Anger att en produkt överensstämmer med europeisk lagstiftning för medicintekniska produkter och att den har verifierats av ett anmält organ.



Tillverkare



Läs bipacksedeln före användning



Tillverkningsbarnummer



Maximum förvaringstemperatur



Utgångsdatum



Förvaras torrt



Medicinteknisk produkt

Tillverkare:

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500

Hämeenlinna, Finland

Information kontakt:

Birger Ledin AB

Tel. 010-707 52 40

info@ledins.se

www.ledins.se

Denna bipacksedel har uppdaterats senast 01.07.2025